

隱翅蟲之防治與宣導

一、認識隱翅蟲：


隱翅蟲(Rove beetle)為一種小型昆蟲，屬於動物界節肢動物門昆蟲綱鞘翅目隱翅蟲科隱翅屬(Paederus)。鞘翅極短，因其翅膀不明顯而得名。以腐敗的植物與腐爛的動物為主食。喜好棲息在稻田、公園、草叢或樹林中，動作迅速靈活，能飛又能爬，主要在夏季出沒，尤其棲息處受到騷擾(如天氣濕熱、雷雨過後、除草、整地、砍樹、收割稻子等)，就會傾巢而出。

隱翅蟲有趨光習性，常在晚上飛入有燈火的地方，夏天在公園散步或野外活動者都是高危險群。由於體型小，甚至於可穿過一般的紗門紗窗，而常潛入住家中，危害人體。所以，即使安坐家中，也有可能受到侵襲。故隱翅蟲常被暱稱為「夏夜裡的毀容怪客」！

隱翅蟲其實並不會螫人，隱翅蟲皮膚炎(Paederus dermatitis)的發生乃因接觸到它含有刺激性物質『隱翅蟲素(Pederin)』的體液，蟲體在皮膚上爬行時，就會從關節腔中分泌出體液，而引起皮膚病變，造成典型的線狀病灶，而且只要接觸10-15秒就有反應，讓人感到劇烈灼熱刺痛。當蟲體被打死或捻碎時，體液大量濺出，在24小時內就會造成皮膚的起泡及潰爛。患者沾到刺激性體液之手指，若再去接觸其他區域皮膚，就會引起更廣泛的病灶。

二、有效預防隱翅蟲侵襲的措施如下：

- 1.在野外或草地活動，應穿著長袖衣物或使用驅蟲液。
- 2.隱翅蟲因有趨光習性，就寢前應先檢查床舖是否有隱翅蟲，就寢時最好要關燈，並使用蚊帳。
- 3.看到隱翅蟲時，千萬不可用手拍打，最好用扇子煽走或用嘴巴把它吹走。萬一接觸到蟲體體液，應迅速以肥皂及大量清水洗淨。
- 4.夏季夜晚是昆蟲特別活躍的時刻，遇到昆蟲上身時，不可直接拍打的反射動作，看清楚是不是隱翅蟲，以免愈拍愈嚴重。



隱翅蟲皮膚炎引起的皮膚發炎及潰爛的外觀通常挺嚇人，但若處置得宜，病灶可在3-4天乾燥，一周左右即可痊癒。然而若未適當處理，則可能引起細菌感染及全身過敏反應，甚至於留下不可逆性的色素沉澱疤痕！所以，一旦被隱翅蟲接觸，首要工作就是用清水溫和地沖洗病灶，並以乾淨紙巾或毛巾壓乾病灶，然後迅速就醫，臨床上可以酌情使用抗組織胺、抗生素或外用藥膏來緩解症狀。